



RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO (KINSHASA)

Résultats de l'enquête par panel de la Phase 4
Juin-Août 2024

PRINCIPAUX RÉSULTATS



Parmi les femmes ayant un besoin non satisfait en 2024, 56% ont continué à être non-utilisatrices de méthodes contraceptives et 37% ont cessé d'utiliser une méthode entre 2022 et 2024.



La moitié de femmes (51%) qui ont affirmé avoir l'intention d'utiliser la PF en 2022, ont adopté une méthode contraceptive en 2024.




Les utilisatrices des méthodes à courte durée d'action interrompent souvent leur utilisation ou (re)passent à des méthodes traditionnelles

SECTION 1: DYNAMIQUES CONTRACEPTIVES GLOBALES

CHANGEMENT DANS L'UTILISATION DE LA CONTRACEPTION


Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans qui ont modifié leur statut d'utilisation contraceptive entre la Phase 1 (février 2020), la Phase 2 (mars 2021), la Phase 3 (avril 2022), et la Phase 4 (août 2024) de PMA (n= 1074).



Chaque flèche du diagramme de Sankey représente le flux des femmes d'un statut d'utilisation de la contraception à un autre parmi les femmes du panel qui ont terminé toutes les quatre Phases de PMA. De gauche à droite, le Sankey montre le flux entre la Phase 1 et la Phase 2, entre la Phase 2 et la Phase 3, et entre la Phase 3 et la Phase 4. La couleur de chaque flèche représente le statut d'utilisation de la contraception lors de la Phase initiale des deux Phases (une flèche grise allant de la Phase 2 à la Phase 3 représente les femmes qui étaient enceintes lors de la Phase 2 par exemple). Le N de chaque flèche est le nombre pondéré de femmes qui sont passées du statut d'utilisation de la contraception lors de la Phase initiale au statut d'utilisation lors de la Phase suivante. La largeur de la flèche est proportionnelle au nombre de femmes représentées.

CHANGEMENT DE MÉTHODE CONTRACEPTIVE

Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans qui ont changé leur méthode contraceptive ou leur statut d'utilisation contraceptive entre la Phase 1 (février 2020), la Phase 2 (mars 2021), la Phase 3 (avril 2022), et la Phase 4 (août 2024) de PMA (n= 1074)



Chaque flèche du diagramme de Sankey représente le flux des femmes d'un statut d'utilisation de la contraception à un autre parmi les femmes du panel qui ont terminé toutes les quatre Phases de PMA. De gauche à droite, le Sankey montre le flux entre la Phase 1 et la Phase 2, entre la Phase 2 et la Phase 3, et entre la Phase 3 et la Phase 4. La couleur de chaque flèche représente le statut d'utilisation de la contraception lors de la Phase initiale des deux Phases (une flèche grise allant de la Phase 2 à la Phase 3 représente les femmes qui étaient enceintes lors de la Phase 2 par exemple). Le N de chaque flèche est le nombre pondéré de femmes qui sont passées du statut d'utilisation de la contraception lors de la Phase initiale au statut d'utilisation lors de la Phase suivante. La largeur de la flèche est proportionnelle au nombre de femmes représentées.


PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 1 : DYNAMIQUES CONTRACEPTIVES GLOBALES

- Les trajectoires des utilisatrices sont très chaotiques et l'utilisation d'une même méthode contraceptive sur le long terme pose problème
- Près de 40% d'utilisatrices de 2022 étaient non-utilisatrices en 2024
- Plus d'une utilisatrices sur trois des méthodes de courte durée d'action en 2022, ont abandonné l'utilisation des méthodes modernes en 2024, et 16 % des utilisatrices des méthodes de courte durée d'action ont changé leurs méthodes initiales en faveur des méthodes traditionnelles.

SECTION 2: DYNAMIQUES CONTRACEPTIVES PAR MESURES CLES


CHANGEMENT DE STATUT EN MATIÈRE D'UTILISATION DE LA CONTRACEPTION, PAR ÂGE

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui ont adopté l'un des comportements suivants en matière de contraception entre la Phase 3 (avril 2022) et la Phase 4 de PMA (août 2024), par âge




CHANGEMENT DE STATUT EN MATIÈRE D'UTILISATION DE LA CONTRACEPTION, PAR NIVEAU D'ÉDUCATION

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui ont adopté l'un des comportements suivants en matière de contraception entre la Phase 3 (avril 2022) et la Phase 4 de PMA (août 2024), par niveau d'éducation




CHANGEMENT DE STATUT EN MATIÈRE D'UTILISATION DE LA CONTRACEPTION, PAR STATUT MATRIMONIAL

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui ont adopté l'un des comportements suivants en matière de contraception entre la Phase 3 (avril 2022) et la Phase 4 de PMA (août 2024), par statut matrimonial



CHANGEMENT DE STATUT EN MATIÈRE D'UTILISATION DE LA CONTRACEPTION, PAR PARITÉ

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui ont adopté l'un des comportements suivants en matière de contraception entre la Phase 3 (avril 2022) et la Phase 4 de PMA (août 2024), par parité




PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 2 : DYNAMIQUES CONTRACEPTIVES PAR MESURES CLÉS

- Entre 2022 et 2024, moins d'une femme sur cinq (14%) continuait d'utiliser la même méthode contraceptive.
- Les femmes ayant un niveau d'éducation faible avaient tendance à arrêter d'utiliser une méthode, par rapport à celles ayant un niveau d'éducation supérieur.
- Plus la femme avait d'enfant, plus elle utilisait la même méthode entre 2022 et 2024. Pendant ce temps, près de la moitié de nullipares (46%) continuaient à être non-utilisatrices en août 2024.

SECTION 3: AUTRES DYNAMIQUES DU PANEL


INTERRUPTION D'UNE MÉTHODE

Parmi les femmes âgées de 15-49 ans ayant un besoin non satisfait à la Phase 4, pourcentage de celles qui ont arrêté d'utiliser une méthode contraceptive ou qui sont tombées enceintes depuis la Phase 3 (n= 290)




SOUTIEN DU CONJOINT POUR LA PLANIFICATION FAMILIALE

Pourcentage de femmes en union âgées de 15-49 ans qui n'utilisaient pas de méthode de PF à la Phase 3 et qui ont adopté une méthode de PF entre la Phase 3 et la Phase 4, selon le niveau de soutien du conjoint pour la PF à la Phase 3 (n=327)




INTENTION D'UTILISER LA PLANIFICATION FAMILIALE

Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans qui n'utilisaient pas une méthode de PF à la Phase 3 et qui ont adopté une méthode de PF entre la Phase 3 et la Phase 4, selon leur intention d'utiliser une méthode de PF à la Phase 3 (n= 1142)



BESOIN NON SATISFAIT POUR LA PLANIFICATION FAMILIALE

Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans qui n'utilisaient pas une méthode de PF à la Phase 2 et qui ont adopté une méthode de PF entre la Phase 3 et la Phase 4, par statut du besoin non satisfait à la Phase 4 (n= 1142)



PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 3 : AUTRES DYNAMIQUES DU PANEL

- Parmi les femmes ayant un besoin non satisfait en août 2024, 56% ont continué à ne pas utiliser une méthode contraceptive et 37% ont arrêté l'utilisation de la PF.
- La proportion de femmes qui ont adopté une méthode contraceptive entre la Phase 3 et la Phase 4 est plus élevée (49%) chez celles dont le conjoint était favorable à la planification familiale au moment de la Phase 3 comparée à celle qui n'étaient pas favorables à la PF (44%).
- La proportion de femmes qui ont adopté une méthode contraceptive entre la Phase 3 et la Phase 4 est plus élevée chez celles qui avaient eu l'intention d'utiliser la planification familiale pendant la Phase 3 (51%) comparée à celle qui n'avaient l'intention d'utiliser la PF (30%)

NOMBRE DE FEMMES DU PANEL

	Total	Ont complété Phase 1	Ont complété Phase 2	Ont complété Phase 3	Ont complété Phase 4	Ont complété Phase 3 & Phase 4	Ont complété les quatre Phases
Enrôlées à la Phase 1	2549	2529	1989	1703	1211	1142	1080
Enrôlées à la Phase 2	838	N/A	831	651	445	417	N/A
Enrôlées à la Phase 3	743	N/A	N/A	739	435	432	N/A
Total de femmes du Pannel	4130	2529	2820	3093	2091	1991	1080

Dans la province de Kinshasa, PMA République Démocratique du Congo collecte des données représentatives au niveau provincial sur la connaissance, la pratique et la couverture des services de planning familial dans 58 zones de dénombrement en utilisant une approche d'échantillonnage par grappes stratifiées à deux degrés, au niveau urbain. L'enquête panel de PMA a été menée auprès de 3366 femmes interrogées lors des enquêtes de la Phase 1, Phase 2 et la Phase 3, qui avaient consenti à un suivi, et qui étaient âgées de 15 à 49 ans au moment de l'enquête de la Phase 4 (de juin à Aout 2024). 57% des femmes ont été enrôlées lors de la Phase 1 entre décembre 2019 et février 2020, 21,3% des femmes ont été enrôlées lors de la Phase 2 entre novembre 2020 et février 2021 et 22,1% des femmes ont été enrôlées lors de la Phase 3 entre Décembre 2021 - Avril 2022. Parmi les 3366 répondantes éligibles, 34% n'ont pas été contactées lors du suivi à la Phase 4. Parmi les personnes jointes, 2096 (62%) ont répondu à l'enquête, soit un taux de réponse de 98% parmi les femmes contactées.

Les résultats de l'enquête présentés dans ce rapport concernent les femmes de facto qui ont répondu aux enquêtes du panel à chaque Phase. Les résultats présentés dans la section 1 du rapport sont représentatifs de la population de la Phase 1.

Les estimations présentées dans les sections 2 et 3 sont représentatives de la population de la Phase 3. Les données sociodémographiques utilisées pour la désagrégation des indicateurs ont été recueillies lors de la Phase 3. Pour obtenir plus d'informations sur l'échantillonnage et accéder aux jeux de données complets, visitez le site www.pmadata.org/countries/democratic-republic-congo.

Les pourcentages présentés dans ce dossier ont été arrondis et peuvent ne pas correspondre à 100%. PMA République Démocratique du Congo est dirigé par l'École de Santé Publique de l'Université de Kinshasa via le Centre de Recherche Patrick Kayembe (CRPK). La stratégie et l'appui global est fourni par William H. Gates Sr. Institute for Population and Reproductive Health. Les financements proviennent de la Fondation Bill & Melinda Gates via l'Université de Tulane.